

Descriptions d'espèces nouvelles de l'Archipel  
calédonien,

PAR LE DOCTEUR SOUVERBIE

(20<sup>e</sup> article)

ET LE R. P. MONTROUZIER,

miss. apost. en Calédonie

(17<sup>e</sup> article).

1. PLEUROTOMA ROUGEYRONI, Souverbie (pl. VII, fig. 1).

*Test. elongata, fusiformis, turriculata, longitudinaliter flexuose impresso-striata, funiculis nodosis diversiformibus transverse cincta, apice acuto, alba, late rufo-maculata; anfractus 10-11? (apice fracto), sutura impressa, infra marginata discreti, superi liras quaternas gerentes, ultimus subelongatus, tertiam partem testæ æquans, funiculis 7-8 munitus, basi oblique sulcatus; canali brevi, sublato, postice subrecurvo, oblique sulcato terminatus. Apertura ovato-subelongata, intus subviolaceo-alba, maculis externis subpellucentibus; margine dextro subacuto, superne subprofunde emarginato, sinistrâ superne ad insertionem labri tuberculose incrassato; columella subverticalis.— Ex specimine unico. (Mus. Burdigalense.)*

*Long. 30, lat. max. 10 mill. Apert. (canali incluso) 11 mill. longa, 3/12 lata.*

*Habitat in insula Lifou. (R. P. Lambert.)*

Coq. allongée, fusiforme, turriculée, imprimée longitu-

dinalement de stries d'accroissement flexueuses, ceinte de cordons noueux de forme et grosseur différentes, à sommet acuminé; tours 10-11 ? (exemplaire fracturé au sommet et ne présentant que 9 tours) séparés par une suture bien marquée et marginée en dessus, portant, à l'exception du dernier, qui en a le double à peu près, quatre des cordons déjà mentionnés; le premier, infra-sutural, à petits tubercules, suivi, un peu à distance, sur le milieu des tours, d'un second à gros tubercules, transversalement subdivisés par une strie bien imprimée se continuant dans leurs intervalles, et séparé du premier par une sorte de dépression que parcourent deux ou trois stries bien marquées; le troisième, immédiatement en dessous et composé de tubercules de même grosseur que ceux du premier, est suivi, immédiatement aussi, du quatrième, à tubercules moindres et qui tendent d'autant plus à disparaître sous la suture qu'on les examine sur des tours plus supérieurs; ces quatre cordons se continuent sur le dernier tour, où ils sont suivis de quatre autres environ de moyenne grosseur, puis, en dessous encore, de simples sillons embrassant obliquement le canal terminal, qui est court, assez large et un peu recourbé en arrière. Ouverture ovale-suballongée; bord labial droit, tranchant-mousse, brièvement échancré dans le haut pour le sinus; bord columellaire tuberculeusement épaissi supérieurement. Cette coquille, de couleur blanche, est ornée de trois grandes taches longitudinales roussâtres, tirant un peu au violâtre, dans le bas principalement, sur lesquelles les tubercules se montrent assez généralement en couleur plus claire; intérieur de l'ouverture d'un blanc légèrement violâtre sur lequel se reproduisent un peu, par transparence, les taches intérieures. Vu ce seul exemplaire. (Musée de Bordeaux.)

Nous dédions cette espèce au révérend père Rougeyron, supérieur de la Mission apostolique, à Sydney.

2. PLEUROTOMA GILIBERTI, Souverbie (pl. VII, fig. 2).

*Test. fusiformis, longitudinaliter costata, transversim sulculata, costis rotundatis, latis, subcontiguïs, ad basin anfractus ultimi evanidis, sulculis decussatis, rosea, balteis binis rufis, inæqualibus, intus pellucentibus cingulata; unfr.? (apice fracto) sutura impressa discreti, subconvexi, ultimus antice subascendens, basi attenuatus, in caudam brevem, oblique sulcatam, postice subrecurvam desinens. Apertura angusta, elongato-subtrapeziformis, inferne canaliculata; marginibus subparallelis, dextro subacuto, pone labrum varicoso, intus 7-8 plicatodentato, superne ad insertionem subprofunde et subanguste rotundatim emarginato, columellari subverticali, plicis 3-4 transversis, subascendentibus munito; canali brevi. Ex specimine unico. (Mus. Burdigalense.)*

*Long. 40? lat. max. 4 mill.; apert. (canali incluso) ¼ mill. longa, ¾ lata.*

*Habitat in insula Lifou. (R. P. Lambert.)*

Coq. fusiforme, munie de fortes côtes longitudinales arrondies, subcontiguës, qui disparaissent à la base du dernier tour; elles sont croisées, de même que leurs intervalles, par de petits sillons transverses qui existent seuls et deviennent beaucoup plus prononcés autour de la columelle; tours? (exemplaire fracturé au sommet et n'ayant conservé que 7 tours) séparés par une suture bien marquée, subconvexes, le dernier subascendant en avant, atténué à sa base où il se termine en une courte queue faiblement recourbée en arrière et formant le canal apertural. Ouverture

étroite, subtrapézoïdalement allongée, à bords subparallèles, canaliculée inférieurement, le canal étant assez court et arrondi; bord droit tranchant-mousse, varié en dehors, un peu épaissi en dedans, avec 7-8 petits plis dentiformes, subprofondément et assez étroitement émarginé en rond, tout à fait contre la suture, pour le sinus dont l'ouverture se dirige subverticalement; columelle arrondie, subverticale, portant 5-4 plis transverses subascendants. Cette coquille, de couleur rose, blanche à l'intérieur, est ornée de deux bandes transverses rousâtres, dont l'une, assez étroite, plus rembrunie et plus large que l'autre, est placée juste en dessous de la suture, tandis que la seconde est filiforme, située aux 5/4 inférieurs des tours, et surmonte un espace de couleur fauve clair qui la sépare de la suture placée en dessous; cette bande filiforme et la partie sous-jacente fauve clair ne sont autre chose que les parties d'une *bande unique composée* (l'autre partie étant cachée sous l'insertion des tours) dont on peut suivre la continuation sur le milieu du dernier tour, où elle reproduit de plus, et très-exactement, l'assemblage que forment, à la suture, les deux bandes qui l'accompagnent en dessus et en dessous; cette bande se reproduit par transparence dans l'intérieur de l'ouverture. Vu ce seul exemplaire. (Musée de Bordeaux.)

Nous dédions cette espèce au R. P. Gilibert, missionnaire apostolique à l'île Pot, où il a recueilli nombre d'espèces rares et nouvelles, dont notre Musée a pu profiter, par l'intermédiaire du R. P. Montrouzier.

5. PLEUROTOMA (DAPHNELLA ?) VARICOSA, Souverbie  
(pl. VII, fig. 5).

*Test. fusiformis, subturriculata, apice acuto, longitudinaliter variciformi-costata, transverse filiformi-costulata,*

*longitudinaliter transverseque elevato-striatula, undique striatulis clathratim decussata, subfulvidulo-alba, dorso anfr. ultimi fulvo late maculato, costulis albo interrupte notatis, macula fulva intus pellucente; anfr. 8 sutura impressa discreti, subconvexi, superne obtuse subcarinati, 2 primi (embryonales) levigati, sequentes varicose costati (costis ex primo (8 costas numerante) usque ad ultimum (2-3 gerente) gradatim et rapide minus numerosis), ultimus subelongatus, basi attenuatus. Apert. ovato-oblonga, margine dextro subacuto, pone labrum varicoso, sinistrâli juxta columellam rotundatam, subverticalem adpresso; sinu vix notato, juxta suturam sito; canali brevi, subrotundato. — Ex specimine unico. (Mus. Burdigalense.)*

*Long. 12, lat. max. 4 1/4 mill.; apert. (canali incluso) 5 1/2 mill. longa, 2 lata.*

*Habitat in insula Art (Archip. caledon.). (R. P. Lambert.)*

Coq. fusiforme, subturriculée, à sommet pointu, munie de côtes variciformes longitudinales, de petites côtes transversales filiformes, et, en outre, de très-petites stries élevées, tant transverses que verticales, qui, par leur entrecroisement, forment sur toute la coquille une fine clathration des plus élégantes. Tours 8, séparés par une suture bien marquée, subconvexes, obtusément subcarénés supérieurement, dont 2 (embryonnaires) lisses, les autres avec les côtes déjà mentionnées, et qui ont l'aspect de varices; elles sont au nombre de 8 sur le premier de ces tours et vont en nombre très-rapidement décroissant jusqu'au dernier, qui n'en compte plus que 2, ou 3 si l'on tient compte de celle qui accompagne le labre. Ouverture ovale-oblongue, à bord droit tranchant-mousse, variqueux en dehors, ainsi que nous venons de le dire, le gauche étant

exactement appliqué contre la columelle, qui est subarrondie et presque verticale; sinus à peine indiqué, contre la suture; canal court, subarrondi. Cette coquille, d'un blanc très-légèrement fauve, est munie, sur le dos du dernier tour, d'une grande tache fauve foncé, se reproduisant par transparence dans l'intérieur de l'ouverture, et de petites taches blanches allongées, placées, un peu à distance les unes des autres, sur les petites côtes transversales. Vu ce seul exemplaire. (Musée de Bordeaux.)

4: PLEUROTOMA SCALATA, Souverbie (pl. VII, fig. 4).

*Test. subovato-fusiformis, scalaris, longitudinaliter tenuissime striata et remote elevato-costata, apice acuto, alba, lineis pluribus fulvis puncticulatis et linea interna nigra, laxissime interrupta spiraliter cingulata, lineis inverse pellucidibus, columella fulvidulo tincta; anfractus 8-9? (apice fracto) sutura impressa discreti, breves, inverse conoidales, superne subcarinati, costis remotis, compressis, elevatis, ad carinam exasperatis, basin anfractus ultimi attingentibus ornati. Apertura mediocris, ovato-subtrigona, margine dextro subincrassato, sinistrâ juxta columellam subverticalem exacte adpresso; canalis brevissimus; sinus latus, modice notatus.— Ex specimine unico. (Mus. Burdigalense.)*

*Long. 12, lat. max. 5 mill.; apert. (canali excluso) 4 1/2 mill. longa, 4 1/2 lata.*

*Habitat in insula Nou (Archip. caled.). (R. P. Lambert.)*

Coq. subovale-fusifforme, scalaire, très-finement striée longitudinalement et ornée, dans le même sens, de côtes élevées, très-saillantes supérieurement, à sommet pointu;

tours au nombre de 8-9? (notre exemplaire, fracturé très-près du sommet, en compte 7) séparés par une suture bien marquée, courts, en cônes renversés, subcarénés dans le haut très-près de la suture, portant chacun dix côtes élevées, comprimées, très-saillantes et anguleuses au point correspondant à la carène, disposition qui s'observe jusque sur le dernier tour, où elles se continuent jusqu'à sa base, et dont la dernière concourt à la formation du labre. Ouverture médiocre, subtrigonement ovale, à bord droit subépaissi, le gauche étant très-exactement appliqué contre la columelle avec laquelle il se confond et qui est subverticale; canal excessivement court et assez étroit; sinus large, médiocrement arqué. Cette coquille, d'un blanc sale terne, est ornée, sur toute l'étendue des tours, de nombreuses petites lignes transverses, régulièrement espacées, composées de petits points de couleur fauve et d'une ligne unique (située près de leur base, mais sur le milieu, pour le dernier) *interne* noire, composée de traits allongés très-espacés et correspondant chacun à un espace intercostal; ces deux ordres de lignes se reproduisent chacun, par transparence, sur la face opposée à celle de leur formation. L'intérieur de l'ouverture est blanc et la columelle est légèrement teinte de fauve. Vu ce seul exemplaire. (Musée de Bordeaux.)

5. PLEUROTOMA MOQUINIANA, Montrouzier (pl. VII, fig. 5).

*Pleurotoma Moquiniana*, Montrouzier in sched.

*Test. fusiformis, spira acuminata, longitudinaliter sub-oblique costata et tenuissime striata, basi oblique sulcata, costis subcarinatis, superne prope suturam attenuatis et substrangulatis, basi anfractus ultimi et prope labrum evanidis, alba, sparse fulvo maculata et lineis eodem colore,*

*filiformibus cincta; anfractus 9 sutura impressa discreti, embryonales 2 albi, levigati, cæteri usque ad penultimum subconvexum subplani, ultimus subconvexus, prope labrum gibbosulus, inferne in caudam brevissimam, postice subrecurvam desinens et canalem aperturalem formans. Apert. ovato-subtrapezoidalis, intus alba, margine dextro acuto, sinistrâ juxta columellam subverticalem appresso, superne tuberculose incrassato; sinus subprofundus, rotundatus. — Ex spec. unico. (Mus. Burdigalense.)*

*Long. 12, lat. max. 5 mill.; apert. (canali excluso) 4 3/4 mill. longa, 2 lata.*

*Habitat in insula Art (Archip. caledon.). (R. P. Montrouzier.)*

Coq. fusiforme, à spire acuminée, très-finement striée en long, munie de côtes dirigées dans le même sens, obliquement sillonnée à la base autour du canal terminal; les côtes, à base assez large, sont subcarénées, atténuées et comme subétranglées supérieurement près de la suture et disparaissent, sur le dernier tour, à sa base ainsi que près du labre; tours au nombre de 9, séparés par une suture bien marquée; les 2 premiers, embryonnaires, sont blancs et lisses; les autres, jusqu'au pénultième qui est subconvexe, sont presque plans; le dernier subconvexe, longitudinalement subgibbeux près du labre, sur l'espace dépourvu de côtes, se termine en une très-courte queue, faiblement recourbée en arrière, qui forme le canal de l'ouverture; celle-ci est subtrapézoïdalement ovale, blanche intérieurement; son bord droit est tranchant, à sinus peu profond et arrondi; le gauche, exactement appliqué contre la columelle, qui est subverticale, est tuberculeusement épaissi dans le haut à son point de réunion au labre. Cette coquille, de couleur blanche, est tachée de fauve et pré-

sente, en outre, quelques bandes transverses de même couleur, filiformes, peu marquées et médiocrement continues sur nos deux seuls exemplaires.

6. LOPHOCERCUS (CYLINDROBULLA) SOUVERBIEI, Montrouzier (pl. VII, fig. 6).

*Lophocercus Souverbiei, Montrouzier in sched.*

*Test. cylindracea, tenuissima, fragilis, subtranslucida, tenuissima striata, antice oblique truncata et late aperta, postice rotundato-subacuminata, subepidermide straminea, tenuissima alba; spira parva, depressa; anfr. 3-3 1/2, sutura incisa disjuncti; margine dextro acuto, ventrem anfractus ultimi obtegente, columellari helicoidali ascendente, inferne funiculo inflato marginato.*

*Long. 14, lat. 5 1/2 mill. (Mus. Burdigalense.)*

*Habitat in insula Art (Archip. caledon.). (R. P. Montrouzier). Specim. 8 vidi.*

Coq. cylindracée, très-mince, fragile, subtranslucide, très-finement striée en long, obliquement tronquée et largement ouverte en avant, arrondie et un peu en pointe obtuse en arrière, blanche sous un très-mince épiderme de couleur paille; spire petite, enfoncée; tours au nombre de 3-3 1/2, disjoints par suite de l'absence de suture; ouverture régnant dans toute la longueur de la coquille, très-largement ouverte en avant, et, de ce point au sommet, réduite à l'état de simple fente excessivement étroite; bord externe tranchant, droit, dirigé par-dessus le ventre du dernier tour qu'il recouvre de très-près; le columellaire hélicoïdalement ascendant, visible seulement par la partie antérieure de l'ouverture et marginé inférieurement par un petit renflement formant bourrelet en dehors,

mais qui est creux et canaliculé intérieurement. — Vu 8 exemplaires dont quelques-uns, pour des dimensions de longueur égales, présentent des différences dans leur diamètre transversal.

Espèce très-voisine du *Cylindrobulla Beau*, Fischer (Journ. Conch., vol. V, p. 275, pl. VIII, fig. 8-9, 1857), de la Guadeloupe, dont elle a à peu près les mêmes forme et dimensions, mais qui s'en distinguera toujours très-facilement par sa coloration et surtout (si du moins la figure citée est exacte) par son extrémité postérieure beaucoup moins obtuse.

7. *NATICA GAIDEI*, Souverbie (pl. VII, fig. 7).

*Test. subglobosa, umbilicata, laevigata, longitudinaliter et tenuissima striata, superne radiatim subretroverse rugata, alba, spiraliter fulvo-rufescente & lineata, cum zona eodem colore subpallidior, lineam primam superante et lineis longitudinalibus, irregulariter flexuosis, biserialiter transverse dispositis; spira semiglobulosa, apice obtusa; anfr. 5 sutura subdepressa discreti, convexi, ultimus subglobosus. Apert. oblique semilunaris, intus alba; labro subacuto; umbilico pervio, profundo, intus callo mediocri, spiraliter ascendente munito. — Operculum? — Ex specimenibus duobus. (Mus. Burdigalense.)*

*Long. 10 1/2 mill.; apert. 7 mill. longa, 3 lata.*

*Habitat in insula Lifou (Archip. caledon.). (R. P. Lambert.)*

Coq. subglobuleuse, ombiliquée, lisse et luisante, très-finement striée dans le sens longitudinal, radialement imprimée, en dessus, de rides bien marquées partant de la suture et se dirigeant subobliquement en arrière;

spire saillante, obtuse au sommet, composée de cinq tours séparés par une suture subenfouée et bien marquée; les trois premiers sont subconvexes, le quatrième convexe et le dernier subanguleux. Ouverture oblique, semi-lunaire, à bord labial subtranchant-mousse; le columellaire, très-faiblement arqué, s'étale un peu dans le haut sur le ventre de la coquille et circonscrit, dans le bas, sa cavité ombilicale qui est peu large, très-profonde et obstruée, en partie, par une callosité assez faible qui remonte spiralement dans sa profondeur. Cette coquille, qui est blanche tant en dedans qu'en dehors, est ornée de quatre lignes spirales de couleur fauve-roussâtre, filiformes, non interrompues, parallèles, subéquidistantes, la supérieure étant surmontée d'une zone médiocrement large, d'un fauve plus clair, envahissant quelquefois, en partie, l'espace interlinéaire sous-jacent, et de lignes longitudinales, fauve-roussâtre également, subirrégulièrement flexueuses, un peu distantes, disposées en deux séries spirales de largeur différente; de ces deux séries, celle aux traits les plus longs, la supérieure, est limitée à l'espace compris entre la seconde strie spirale et le bord supérieur de la zone fauve qui la surmonte, et l'autre à celui compris entre les deux lignes inférieures, et cela sans jamais dépasser ces limites; du moins sur nos *deux seuls exemplaires* (Musée de Bordeaux).

Dédiée au R. P. Gaide, missionnaire apostolique, à l'île Lifou, qui s'occupe, avec zèle, d'histoire naturelle et auquel nous sommes redevable, par l'intermédiaire de notre ami commun, le R. P. Lambert, promoteur de la présente dédicace, de la plupart des espèces de cette provenance que nous publions aujourd'hui.

8. NATICINA PAPILLA (NERITA), Chemnitz.

*Operculum* (pl. VII, fig. 8).

*Operc. corneum, spiratum, translucidum, pallide succineum, semilunare, infra medium utroque latere subsinuatum et plica transversali, ex vicino nuclei ad marginem columellarem incurvatim decurrente bipartitum; pars infera imbricatim et subremote superam subobtegens; nucleus infra medium situs; anfract. pauci 3 rapidissime accrescentes, arcuatim subplicato-striati, suturu supra prominula, infra canaliculata et aream inæqualiter dividente marginati.*

*Habitat in insula Art (Archip. caledon.). (Mus. Burdigalense.) Spec. 12 vidi.*

Opercule corné, spiré, translucide, couleur de succin pâle, semi-lunaire, subsinueux aux bords opposés, un peu au-dessous du milieu, et divisé en deux parties inégales, à ce niveau, par un pli transversal courbe, se dirigeant du voisinage du nucléus au bord columellaire, la partie inférieure étant subimbriquée en recouvrement et un peu à distance sur le bas de la supérieure, bien que s'y reliant cependant sous le pli, en sorte que ces deux parties ne se trouvent plus sur le même plan; nucléus situé en dessous du milieu, presque à égale distance des bords latéraux; tours de spire peu nombreux—3—croissant très-rapidement, avec des stries subpliciformes arquées, partant en rayonnant de la suture qui est saillante en dessus, canaliculée en dessous, et divise l'opercule en deux surfaces de formes très-différentes, la supérieure étant hélicoïde et l'inférieure dolabelliforme.

Nous n'avons trouvé consignée nulle part, dans les auteurs que nous avons pu consulter à cet égard, la descrip-

tion de l'opercule des *Naticina*, qui paraîtrait être inconnu (ainsi, du reste, que l'animal); ce qui constitue une lacune très-regrettable dans la caractéristique de ce genre. C'est en vue de combler cette lacune, si tant est qu'elle existe réellement, que nous avons cru devoir donner les diagnose et figure de l'opercule de l'espèce portée en tête de cet article, dont nous avons été à même de voir 12 exemplaires.

9. *NERITOPSIS RADULA* (NERITA), Linné (*Operculum*).

*Operc. calcareum, albo-margaritaceum, crassum, subsymmetricum, antice semilunare, postice ad marginem columellarem trigonum; area externa percallosa, callo crasso, laevigato, postice ad partem medianam transverse subcorrugato, utroque latere fossulato, antice sinuoso et prominente, marginem anticum non attingente et ab illo spatio impresso-punctato subremoto; area interna concava, transverse inæqualiter bipartita; pars antica semilunaris, lævissima, prope limbum sulco lato, vix profundo, longe semilunari marginata; postica (muscularis impressio) tetragona, radiatim et valide impresso-striata, utroque latere fossula sat profunda instructa. (Mus. Burdigalense.)*

La science est redevable de la découverte de cet intéressant opercule au R. P. Lambert, ce zélé et si désintéressé pourvoyeur de notre Musée bordelais, qui, ayant eu la bonne fortune de recevoir d'Ouagap, où l'espèce ne paraît pas être rare, deux exemplaires complets du *Neritopsis radula*, s'est empressé de nous en adresser un, avec offre de le faire suivre de l'animal *in spiritu*; offre que nous nous sommes d'autant plus empressé d'accepter, que, à ce que nous croyons du moins, ce dernier est

aussi inconnu, au moment actuel, que l'était, hier encore, sa pièce accessoire. Cette pièce sera figurée prochainement dans le Journal de Conchyliologie.

10. PECTEN LAMBERTI, Souverbie (pl. VII, fig. 9).

*Testa clausa, æquivalvis, subovato-rotunda, suboblique flabelliformis, compressa, multicostata, auriculis parvis, æqualibus, radiatim impresso-striatis; costis mediocriter prominentibus, numerosis, subconvexis, ad latera peratenuatis et vix numerabilibus, striis elevatis, concentricis, confertissimis, tenuissime subcrenulatis, decussatis; costis interstitiisque valvæ inferioris costulis elevatis, parvis, numerosis undique radiatis; pagina interna vulvarum ad marginem anticum posticalemque brevissime plicatim crenulata, ad marginem ventralem dentata; alba, valva supera extus radiis 4 rubello-aurantiacis, maculis carneolo-subluteolis albisque transverse plus minusve interruptis ornata, intus ad umbonem subpurpureo tincta; valva infera extus puncticulis aurantiacis adspersa, intus alba. — Ex specimine unico (Mus. Burdigalense.)*

*Long. 72, lat. 7 mill.; alt. 17 mill.*

*Habitat in insula Lifou? (Loyalty). (R. P. Lambert.)*

Coq. close, équivalve, subovale-arrondie, subobliquement flabelliforme, comprimée avec des côtes nombreuses, les oreilles égales et imprimées de stries rayonnantes bien marquées; les côtes sont médiocrement saillantes, subconvexes et excessivement atténuées près des bords latéraux, où on ne les compte plus que très-difficilement, les autres pouvant se nombrer à 58 approximativement; elles sont ornées de très-petites stries élevées, concentriques, très-serrées, très-finement entaillées et comme

crénelées, produisant, vues à la loupe, un effet très-élegant; sur la valve inférieure se remarquent, en outre, tant sur les côtes que sur leurs intervalles, de très-nombreuses petites côtes rayonnantes élevées, ces côtes n'étant qu'à peine indiquées, et cela encore sur quelques points seulement, sur la valve supérieure; intérieur des valves crénelé, à ses bords antérieur et postérieur, par de petits plis très-courts, et denté au bord ventral par la terminaison des intervalles des côtes, lesquels se traduisent assez haut dans la valve, sous forme de deux plis saillants pour chacun d'eux. Cette jolie espèce, dont le test est blanc à l'intérieur, est ornée, sur un fond couleur de chair subjaunâtre, pour la valve supérieure, de quatre rayons assez larges, de couleur orangé rougeâtre, transversalement et plus ou moins irrégulièrement interrompus par celle du fond, sur lequel se remarquent aussi quelques traits blancs, le tout formant ensemble, en quelque sorte, une espèce de marbrure des plus élégantes, et, pour la valve inférieure, sur un fond blanchâtre sale, de nombreuses petites taches éparses orangées; à l'intérieur, la valve supérieure est teintée de pourpré dans l'umbone. Vu ce seul exemplaire.

Dédié à son inventeur, le R. P. Lambert, qui, en nous l'envoyant, nous écrivait (janvier 1875) : je l'ai reçu avec des coquilles venant de Lifou et d'Ouagap; je pense qu'il est de Lifou.

S. et M.

---